

Câu 91. Khi nói về đặc điểm di truyền của các gen trong tế bào, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Hai gen cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể thì luôn xảy ra sự trao đổi chéo.
- B. Các gen trong tế bào chất thường tồn tại thành cặp alen.
- C. Các gen lặn ở vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X thường biểu hiện chủ yếu ở giới XX.
- D. Hai gen nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau thì phân li độc lập trong quá trình hình thành giao tử.

Câu 92. Giả sử ở một quần thể đang chịu tác động của chọn lọc theo hướng chống lại alen trội và bảo tồn alen lặn. Kết quả chọn lọc tự nhiên theo hướng này sẽ dẫn tới:

- A. làm tăng tỷ lệ kiểu hình lặn
- B. làm giảm tỷ lệ kiểu gen dị hợp và tăng tỷ lệ kiểu gen đồng hợp trội
- C. làm giảm tỷ lệ kiểu gen đồng hợp trội và tăng tỷ lệ kiểu gen dị hợp
- D. làm giảm tỷ lệ kiểu hình lặn

Câu 93. Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Trong khoảng chống chịu, sinh vật sinh sản tốt nhất.
- B. Ngoài giới hạn sinh thái khả năng sinh trưởng phát triển của sinh vật kém
- C. Trong khoảng thuận lợi, sinh vật thực hiện các chức năng sống tốt nhất.
- D. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của các loài đều giống nhau

Câu 94. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể $2n = 18$. Trong tế bào thể tam bội của loài này có số nhiễm sắc thể là:

- A. 36
- B. 17
- C. 27
- D. 19

Câu 95. Loại bằng chứng trực tiếp chứng minh quá trình tiến hóa của sinh vật là:

- A. Giải phẫu so sánh.
- B. Hóa thạch.
- C. Tế bào học.
- D. Sinh học phân tử.

Câu 96. Một loài động vật, biết mỗi cặp gen quy định một cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn và không xảy ra đột biến. Phép lai: $AaBbDdEe \times AabbDdee$, thu được F_1 . Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Ở F_1 , loại cá thể có kiểu gen đồng hợp lặn về 4 cặp gen chiếm $3/64$
- B. Ở F_1 , loại kiểu hình có 1 tính trạng trội chiếm $5/8$
- C. F_1 có số loại kiểu hình bằng số loại kiểu gen
- D. Ở F_1 , loại kiểu hình có 3 tính trạng trội chiếm tỉ lệ $3/8$

Câu 97. Một alen dù có hại cũng có thể trở nên phổ biến trong quần thể dưới tác động của nhân tố tiến hóa:

- A. các yếu tố ngẫu nhiên.
- B. chọn lọc tự nhiên.
- C. đột biến.
- D. giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 98. Trong ống tiêu hóa của người, quá trình tiêu hóa hóa học diễn ra chủ yếu ở:

- A. dạ dày.
- B. ruột non.
- C. thực quản.
- D. ruột già.

Câu 99. Cho lai 2 cây bí tròn với nhau thu được đời con gồm 270 cây bí quả tròn : 180 cây bí quả bầu dục : 30 cây bí quả dài. Sự di truyền tính trạng hình dạng quả tuân theo quy luật:

- A. Tương tác cộng gộp.
- B. Tương tác bổ sung.
- C. Gen đa hiệu.
- D. Liên kết hoàn toàn.

Câu 100. Khi nói về chọn lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đây sai?

- A. Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên alen, qua nhiều thế hệ sẽ chọn lọc được kiểu gen.
- B. Chọn lọc tự nhiên chống lại alen trội làm thay đổi tần số alen nhanh hơn chọn lọc chống lại alen lặn.
- C. Chọn lọc tự nhiên làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
- D. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố quy định chiều hướng tiến hoá của sinh giới.

Câu 101. Số liên kết hydro trong gen giảm đi 1 sau khi xảy ra loại đột biến gì?

- A. Thay thế một cặp A-T thành một cặp G-X B. Mất một cặp A-T
 C. Thay thế một cặp G-X thành một cặp A-T D. Thêm một cặp G-X

Câu 102. Một cơ thể có 2 cặp gen dị hợp giảm phân bình thường sinh ra các loại giao tử, trong đó có 20% AB và 30% aB. Kiểu gen của cơ thể này là:

- A. AaBb B. $\frac{AB}{Ab}$ C. $\frac{Ab}{aB}$ D. $\frac{AB}{ab}$

Câu 103. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen Aa và Bb phân li độc lập tương tác bổ sung quy định. Khi trong kiểu gen có cả A và B thì quy định quả đỏ, chỉ có A hoặc B thì quy định quả vàng, không có A và B thì quy định quả xanh. Một quần thể đang cân bằng di truyền có tần số A là 0,3 và b là 0,4. Biết không xảy ra đột biến, theo lý thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?


- I). Số loại kiểu gen của quần thể là 9
 II). Tỷ lệ kiểu hình của quần thể là 42,84% quả vàng: 49,32% quả đỏ: 7,84% quả xanh.
 III). Trong quần thể, loại kiểu gen chiếm tỉ lệ cao nhất là AaBb.
 IV). Lấy ngẫu nhiên một cây quả vàng, xác suất thu được cây thuần chủng là 53/137.
 V). Trong số các cây quả đỏ thì số cây quả đỏ dị hợp chiếm tỷ lệ 110/119.

- A. 3 B. 4 C. 2 D. 1

Câu 104. Khi nói về đột biến cấu trúc NST, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đột biến lặp đoạn NST có thể làm cho 2 gen alen cùng nằm trên 1 NST.
 B. Đột biến mất đoạn NST có thể làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể
 C. Đột biến đảo đoạn không làm thay đổi hình dạng NST.
 D. Đột biến chuyển đoạn trên 1 NST có thể làm tăng số lượng gen trên NST.

Câu 105. Phả hệ dưới đây mô phỏng sự di truyền của bệnh “P” và bệnh “Q” ở người. Hai bệnh này do hai alen lặn nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể thường khác nhau gây ra.



Cho rằng không có đột biến mới phát sinh. Alen a gây bệnh P, alen b gây bệnh Q. Các alen trội tương ứng là A, B không gây bệnh (A, B trội hoàn toàn so với a và b). Nhận định nào sau đây đúng?

- A. Có 6 người trong phả hệ này xác định được chính xác kiểu gen.
 B. Có 3 người trong phả hệ này đã chắc chắn mang một cặp gen dị hợp tử.
 C. Xác suất để người vợ ở thế hệ III mang kiểu gen dị hợp cả hai cặp gen là 2/9
 D. Xác suất để con của cặp vợ chồng ở thế hệ III mang alen gây bệnh là 38/45

Câu 106. Phương pháp nghiên cứu di truyền học của Men Đen là:

- A. Lai phân tích B. Lai và phân tích cơ thể lai
 C. Lai xa D. Lai thuận nghịch

Câu 107. Ví dụ nào sau đây thuộc loại cách li sau hợp tử?

- A. Hai loài sinh sản vào hai mùa khác nhau nên không giao phối với nhau.
 B. Hai loài có tập tính giao phối khác nhau nên không giao phối với nhau.
 C. Hai loài phân bố ở hai khu vực khác nhau nên không giao phối với nhau.

D. Ngựa giao phối với lừa sinh ra con la bị bất thụ.

Câu 108. Sinh vật nào sau đây sống trong môi trường đất?

- A. Thỏ. B. Cá chép. C. Giun đất. D. Mèo rừng.

Câu 109. Loại tế bào nào sau đây là tế bào trần?

- A. Tế bào bị mất tế bào chất B. Tế bào bị mất nhân
C. Tế bào bị mất thành xenlulôzơ D. Tế bào bị mất màng tế bào

Câu 110. Trong các phương pháp tạo giống mới, phương pháp nào sau đây thuộc công nghệ tế bào?

- A. Gây đột biến, sau đó chọn lọc để được giống mới.
B. Dung hợp tế bào trần khác loài tạo ra thể song nhị bội.
C. Cho lai hai dòng thuần chủng để tạo ưu thế lai.
D. Chuyển gen từ tế bào của người vào tế bào vi khuẩn.

Câu 111. Ở thực vật, hô hấp hiếu khí xảy ra mạnh ở:

- A. Lá. B. Hạt đang nảy mầm C. Cánh hoa D. Hạt khô

Câu 112. Ở một loài thực vật lưỡng bội, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng, các gen phân li độc lập và không xảy ra đột biến. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng?

- I). Cho cây thân cao, hoa đỏ lai phân tích, nếu đời con có 4 kiểu hình thì sẽ có 4 kiểu gen.
II). Cho 2 cây thân cao, hoa đỏ giao phần với nhau, thu được F₁. Nếu F₁ có 4 loại kiểu gen thì có thể có 2 kiểu hình.
III). Cho cây thân cao, hoa trắng giao phần với cây thân thấp, hoa trắng, thu được F₁. Nếu F₁ có 1 loại kiểu gen thì chứng tỏ số cây thân cao, hoa trắng F₁ chiếm 50%.
IV). Cho một cây thân cao, hoa đỏ tự thụ phấn, thu được F₁. Nếu F₁ có 2 loại kiểu hình thì F₁ có thể có 4 loại kiểu gen.

- A. 1 B. 2 C. 4 D. 3

Câu 113. Trong một khu rừng rộng 100 ha có một quần thể voi gồm 20 con. Mật độ cá thể của quần thể voi này là:

- A. 5 con/ha. B. 2 con/ha. C. 0,2 con/ha. D. 0,5 con/ha.

Câu 114. Bộ ba nào **không** phải là bộ ba kết thúc?

- A. 5'UAA3' B. 5'UGA3' C. 5'UUA3' D. 5' UAG3'

Câu 115. Ở một loài thực vật, xét 2 cặp gen Aa và Bb. Cho 2 cây (P) giao phần với nhau, thu được F₁. Ở F₁, loại kiểu hình có 2 tính trạng trội có 3 kiểu gen quy định và kiểu gen đồng hợp lặn về 2 cặp gen chiếm tỉ lệ 9%. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị thì tần số hoán vị ở 2 giới là như nhau. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

- I). Kiểu gen có 1 alen trội ở F₁ chiếm tỉ lệ 25%
II). Kiểu gen có 2 alen trội ở F₁ chiếm tỉ lệ 32%
III). Kiểu gen có 4 alen trội ở F₁ chiếm tỉ lệ 4%
IV). Kiểu gen có 3 alen trội ở F₁ chiếm tỉ lệ 9%

- A. 1 B. 4 C. 3 D. 2

Câu 116. Giới hạn sinh thái về nhiệt độ của cá rô phi Việt Nam là từ:

- A. 0°C – 40°C B. 5,6°C – 42°C C. 2°C – 44°C D. 20°C – 35°C

Câu 117. Khi nói về đột biến lệch bội, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Đột biến lệch bội thường tạo ra con lai sinh sản hữu tính bình thường.
B. Đột biến lệch bội thường làm thay đổi số lượng gen trên một nhiễm sắc thể.
C. Đột biến lệch bội thể ba có số nhiễm sắc thể là 2n - 1
D. Đột biến lệch bội có thể xảy ra trong giảm phân hoặc nguyên phân.

Câu 118. Trong quần thể, sự phân bố ngẫu nhiên của các cá thể có ý nghĩa là:

- A. Làm giảm mức độ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể
- B. Làm biến đổi thành phần kiểu gen và tần số alen của quần thể.
- C. Giúp sinh vật tận dụng nguồn sống tiềm tàng trong môi trường
- D. Giúp các cá thể hỗ trợ nhau chống lại điều kiện bất lợi của môi trường

Câu 119. Một quần thể thực vật đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số kiểu gen aa là 0,16. Theo lý thuyết tần số alen A của quần thể này là:

- A. 0,32. B. 0,4. C. 0,48. D. 0,6.

Câu 120. Khi nói về quá trình quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?

- A. Pha tối của quang hợp không cần ánh sáng nhưng xảy ra phụ thuộc vào pha sáng
- B. Sản phẩm đầu tiên của TV C₃ là hợp chất Ribulozo 1,5 diphosphat
- C. Sản phẩm pha tối là ATP và NADPH được dùng làm nguyên liệu cho pha sáng.
- D. Hiệu suất quang hợp của thực vật C₃ luôn cao hơn thực vật C₄.

 HẾT

ĐÁP ÁN

81D	82B	83D	84A	85B	86C	87D	88D	89B	90B
91D	92A	93C	94C	95B	96D	97A	98B	99B	100A
101C	102C	103A	104A	105D	106B	107D	108C	109C	110B
111B	112A	113C	114C	115A	116B	1117D	118C	119D	120A